



Impfkalender 2016/2017 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2016

 Säuglinge und Kleinkinder
(2 – 23 Monate)

 Kinder und Jugendliche
(2 – 17 Jahre)

 Erwachsene
(ab 18 Jahre)

| Impfungen | Säuglinge und Kleinkinder (2 – 23 Monate) | | | | | Kinder und Jugendliche (2 – 17 Jahre) | | | | Erwachsene (ab 18 Jahre) | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|----------|--------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| | 6 Wochen | 2 Monate | U4 3 Monate | 4 Monate | U6 11–14 Monate | U7 15–23 Monate | 2–4 Jahre | U9 5–6 Jahre | J1 9–14 Jahre | 15–17 Jahre | ab 18 Jahre | ab 60 Jahre |
| Tetanus > | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | A1 | A2 | | A (alle 10 Jahre) | |
| Diphtherie > | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | A1 | A2 | | A (alle 10 Jahre) | |
| Keuchhusten (Pertussis) > | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | A1 | A2 | | A ^d | |
| Hib (Haemophilus influenzae Typ b) > | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | | | | | |
| Kinderlähmung (Poliomyelitis) > | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | | A | | ggf. N | |
| Hepatitis B > | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | | | | | | |
| Pneumokokken > | | G1 ^b | | G2 | G3 | N | | | | | | S ^f |
| Rotaviren > | G1 ^a | G2 | (G3) | | | | | | | | | |
| Meningokokken C > | | | | | G (ab 12 Monaten) | | N | | | | | |
| Masern > | | | | | G1 | G2 | N | | | | S ^e | |
| Mumps > | | | | | 3-fach-Impfung MMR | 3-fach-Impfung MMR + Windpocken | N | | | | | |
| Röteln > | | | | | 3-fach-Impfung MMR | 3-fach-Impfung MMR + Windpocken | N | | | | | |
| Windpocken (Varizellen) > | | | | | G1 | G2 | N | | | | | |
| Gebärmutterhalskrebs (HPV) > | | | | | | | | | ♀ G1+G2 ^c | ♀ N ^c | | |
| Grippe (Influenza) > | | | | | | | | | | | | S (jährlich) |

Personen mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- U** Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Kinder
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1–G4)
- S** Standardimpfung
- ♀** Impfpfehlungen für Mädchen und junge Frauen

- J** Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischimpfung

^a die 1. Impfung möglichst ab vollendeter 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
^b Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
^c je nach Impfstoff 2 Impfungen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren, bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter >13 bzw. 14 Jahren 3 Impfungen
^d einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
^e Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Immunschutz
^f einmalige Impfung ab 60 Jahre, je nach Gesundheitszustand ggf. Auffrischung