

Impfkalender 2020/2021 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand August 2020

 **Säuglinge und Kleinkinder**
(2 – 23 Monate)

 **Kinder und Jugendliche**
(2 – 17 Jahre)

 **Erwachsene**
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	U4 2	U4 3	U4 4	U5 5–10	U6 11*	U6 12	13–14	15	U7 16–23	U7a/U8 2–4	U9 5–6	U10 7–8	U11/J1 9–14	15–16	J2 17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1 ^a		G2	G3														
Tetanus		G1 ^b				G3 ^c	N					A1	N	A2		N		A alle 10 Jahre
Diphtherie		G1 ^b				G3 ^c	N					A1	N	A2		N		A alle 10 Jahre
Keuchhusten (Pertussis)		G1 ^b				G3 ^c	N					A1	N	A2		N		A ^e N
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		G1 ^b				G3 ^c	N											
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		G1 ^b				G3 ^c	N							A		N		
Hepatitis B		G1 ^b				G3 ^c	N											
Pneumokokken		G1 ^b				G3 ^c	N											S ^g
Meningokokken C							G1	N										
Masern						G1	N			G2	N							S ^f
Mumps						G1	N			G2	N							
Röteln						G1	N			G2	N							
Windpocken (Varizellen)						G1	N			G2	N							
HPV (Humane Papillomviren)														G1 ^d +G2 ^d	N			
Gürtelrose (Herpes Zoster)																		G1 ^h +G2 ^h
Grippe (Influenza)																		S jährlich

Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- G** Grundimmunisierung (bis zu drei Teilimpfungen G1–G3)
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- S** Standardimpfung
- A** Auffrischimpfung

- a** die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
 - b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
 - c** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung 6 Monate
 - d** 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9–14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter > 14 Jahre sind 3 Impfungen erforderlich
 - e** einmalige Auffrischung; möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
 - f** einmalige Impfung für alle nach 1970 Geborene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit
 - g** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff
 - h** zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden